Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010

Función VAR.P(número1;[número2];…)

Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores, calcula la varianza poblacional. El argumento “número” contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores numéricos, almacena el valor o los valores utilizados para calcular la varianza. Los argumentos “número2” hasta “númeron” son opcionales, cada uno de ellos contiene un valor numérico, la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores numéricos, contiene otros valores que sirven de base para calcular la varianza. Eta función acepta mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Si alguno de los argumentos contiene celdas vacías, con valores de tipo texto o con valores lógicos, la función no los tiene en cuenta para calcular el resultado.

En la Figura 94 hay dos ejemplos con la función VAR.P. En la celda A2 la función tiene un argumento, el rango C2:C7. Calcula la varianza para las ventas efectuadas entre enero y junio, el resultado es 2,6667. En la celda A3 la función VARP tiene dos argumentos, los rangos C2:C7 y E2:E7, la función devuelve 2,6667. Observe que las celdas que no tienen contenido, son pasadas por alto para hacer los cálculos.

Figura 94



Derechos reservados de autor. misapuntessistemas@gmail.com. D. Bermúdez.